Laboratuvar Test Değişiklikleri

(19.10.2026)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8916003	Triptik Aktivite, Gaita				X						
2	C8352018	Adiponektin				X						
3	C8648001	QuantiFERON TB-Gold (Gama İnterferon Salınım Deneyi) (IGRA)						X				
4	C8684916	Alzheimer/Demans Biyobelirteç Paneli (Aβ40/42, p-Tau217, p-Tau181, GFAP ve NfL), Plazma	X									
5	C8684920	Travmatik Beyin Hasarı (TBI) Biyobelirteç Paneli (BD-Tau, UCH-L1, GFAP, NF-Light), Plazma	X									
6	C8684917	Alzheimer/Demans Biyobelirteç Paneli (Aß40/42, p-Tau217, p-Tau181, GFAP ve NfL), BOS	X									

1

Triptik Aktivite, Gaita

Test Kodu : **8916003** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **MİKROSKOPİ** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **4 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Gaita, Dondurulmuş	Plastik Kap	1gr	<0°C

2

Adiponektin

Test Kodu : **8352018** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **ELİSA** - Çalışma Günü : **Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **14 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C

3

QuantiFERON TB-Gold (Gama İnterferon Salınım Deneyi) (IGRA)

Test Kodu : **8648001** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **EİA** - Çalışma Günü : **Pzt-Per 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Çar-Cmt 18:00 Pzt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Laboratuvara Danışınız	Laboratuvara danışınız		2-8°C

Ek Bilgiler

Laboratuvara Danışınız

Bu test için kan örneği dört farklı özellikte tüpe alınır. QuantiFERON Nil (beyaz halka ve gri kap), TB1 (beyaz halka ve yeşil kap), TB2 (beyaz halka ve sarı kap) ve Mitojen (beyaz halka ve mor kapak). 17°C 25°C de bekletilen tek hasta paketindeki her bir QuantiFERON®-TB Gold tüpüne (Nil, TB1, TB2 ve Mitogen tüpleri) 1 ml kan alınır. Tüpler işaretli çizgiye kadar alındıktan hemen sonra, tüpün iç kısmının her tarafı kanla kaplanacak şekilde 10 kez alt üst edilir. Aşırı kuvvetli sallamalardan kaçınılmalıdır. Tüpler karıştırıldıktan sonra 37 ° C'de 16-24 saat boyunca dikey olarak inkübe edilmelidir. Hasta paketindeki QuantiFERON®-TB Gold tüpüne (Nil, TB1, TB2 ve Mitogen tüpleri) alınan kan örneği inkübasyon öncesi en fazla 16 saat oda ısısında bekletilebilir. İnkübasyonun ardından tüpler plazmanın ayrılması için 2000-3000 RFG (g) 'de 15 dakika santrifüjlenir. Kan örneği lityum ya da sodyum heparin içerikli tüpe alınıp daha sonrasında hasta paketindeki QuantiFERON®-TB Gold tüpü (Nil, TB1, TB2 ve Mitogen tüpleri)içerisine aktarıldığında inkübasyon öncesi oda ısısında en fazla 3 saat, 2-8 C° de en fazla 48 saat bekletilebilir. 2-8 C° bekletilen örneklerin QuantiFERON®-TB Gold tüpüne aktarımı öncesi oda ısısına gelmeleri beklenmelidir. QuantiFERON®-TB Gold tüplerine aktarım sonrası en geç 2 saat içerisinde inkübasyon başlatılmalıdır. İnkübasyonun ardından tüpler plazmanın ayrılması için 2000-3000 RFG (g) 'de 15 dakika santrifüjlenir. Hemolizli,lipemik ve santrifüjlenmeyen ya da inkübasyon öncesi oda sıcaklığında belirtilen süreden fazla bekletilen örnekler test için uygun değildir.